



Caratteristiche

Concime liquido



ENZIMOL è una soluzione fertilizzante azotata contenente magnesio e zolfo.

Questa particolare composizione stimola lo sviluppo delle piante, grazie alla pronta assimilazione dell' azoto e del magnesio. L' azoto e lo zolfo contenuti hanno un ruolo fondamentale nella fotosintesi come componenti delle proteine, svolgendo un' azione enzimatica fondamentale per le piante in grado di assicurare una maggiore crescita, foglie più verdi, aumento di fioritura. L' alta percentuale di magnesio assimilabile risulta indispensabile durante la fioritura e nelle fasi che precedono la maturazione dei frutti.

ENZIMOL è inoltre arricchito con estratti vegetali e alghe di ottima qualità che permettono una maggiore assimilazione del prodotto in condizioni climatiche limitate, permettendo il 50% di assimilazione del prodotto sulle foglie in solo 2 ore. Ottimo da applicare anche in presenza di attacchi parassitari, garantendo alle piante una maggiore resistenza.

Sui cereali il prodotto è utilizzabile in abbinamento ai diserbanti.

Composizione

AZOTO (N) TOTALE 19% p/p

Azoto (N) Ureico 19% p/p

Ossido di Magnesio (MgO) 5% p/p idrosolubile

Anidride Solforica (So3) 10% p/p idrosolubile

Fertirrigazione

VITE: 20-25 LT/HA all' inizio della crescita

FRUTICULTURA: 25-30 LT/HA all' inizio della fioritura e durante la crescita.

ORTICULTURA: 10-20 LT/HA durante le fasi di fioritura e crescita dei frutti

Compatibilità

ENZIMOL è compatibile con i comuni concimi , diserbi e fungicidi.

In caso di miscela con prodotti chimici per la difesa, effettuare prove di compatibilità.

Applicare il prodotto subito dopo la diluizione in acqua. Non va conservato diluito.

Note utili

Preservare da temperature prossime allo 0°C e superiori ai 50°C.

Non sovrapporre più di due contenitori .

In caso di fuoriuscita del contenuto usare materiali assorbenti idonei.

Applicazioni Fogliari

GRANO E CERALI: 20 LT/HA di prodotto alla 4°-8° foglia o a foglia a bandiera.

Qualora venga impiegato con fitosanitari: 5-10 LT/HA, superando così lo stress dovuto all' applicazione dei fitofarmaci.

MAIS: 10-15 LT/HA allo stadio di 6 foglie

GIRASOLE: 10-15 LT/HA allo stadio di 2-3 foglie vere

FRUTTETI E VIGNETI: 10-20 LT/HA all' inizio della fuoriuscita della prima vegetazione

UVA DA MOSTO: 10-20 LT/HA applicato anche in fase di invaiatura per migliorare la fermentazione del mosto:

ORTICULTURA: 5-10 LT/HA durante le fasi di crescita delle piantine

PATATE: 20-25 LT/HA durante la fase di tuberizzazione

COLZA: 20-25 LT/HA all' emissione delle infiorescenze; 15-20 LT/HA in pre-fioritura

Nell' utilizzo impiegare un volume d' acqua per ottenere una buona bagnatura. Inserire il prodotto dopo che si è riempita metà botte d' acqua con l' agitazione azionata versare lentamente poi finire il riempimento della botte stessa.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Confezioni

Kg 1 - Kg 6 - Kg 12 - Kg 20