

Caratteristiche

Concime liquido



START 1 è un formulato studiato per esaltare le fasi vegetative iniziali delle colture, favorendo uno sviluppo rapido ed equilibrato della pianta. La sua azione si traduce in un incremento della produzione e in un miglioramento dell'ingrossamento dei frutti, grazie a una nutrizione mirata nelle fasi più delicate del ciclo colturale.

Il prodotto stimola attivamente la formazione di foglie e fusti, promuovendo un apparato vegetativo più sviluppato, vigoroso e funzionale. Ciò consente alla pianta di aumentare la propria capacità fotosintetica e di sostenere in modo più efficace le successive fasi produttive.

START 1 è particolarmente indicato per piante nelle prime fasi di accrescimento, alle quali conferisce maggiore vigore e uniformità di sviluppo. L'impiego regolare favorisce una crescita armoniosa, migliorando la resistenza agli stress ambientali e ponendo le basi per produzioni più abbondanti e di elevata qualità.

Composizione

Azoto (N) Totale 28,0 % p/p
• Azoto (N) Nitrico 7,0% p/p
• Azoto (N) Ammoniacale 7,0% p/p
• Azoto (N) Ureico 14,0% p/p

Boro (B) 0,05% p/p nella forma di acido borico idrosolubile
Rame (Cu) 0,05% p/p nella forma di solfato idrosolubile
Manganese (Mn) 0,12% p/p nella forma di solfato idrosolubile
Zinco (Zn) 0,07% p/p nella forma di solfato idrosolubile

CMC1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

Questo concime contiene Urea che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali devono essere adottate adeguate misure correttive

Fertirrigazione

Colture arboree e da frutto: 60 - 100 Kg/Ha.
Colture orticole: 50 - 80 Kg/Ha.
Colture floricole: 40 - 80 Kg/Ha.

Diminuire le dosi in terreni poco sciolti.

Applicazione Fogliare

Colture arboree e da frutto: 200 - 300 Gr/Hl.
Colture orticole: 200 - 250 Gr/Hl.
Colture floricole: 150 - 200 Gr/Hl.

Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi di applicazione

Confezioni

Kg 1 - Kg 6 - Kg 12 - Kg 30

Note utili

- Preservare da temperature prossime allo 0°C e superiori ai 50°C.
- Prima dell'impiego, consigliamo effettuare dei test su una parte della coltura.
- È consigliato fare i trattamenti fogliari durante le ore fresche del mattino oppure alla fine della giornata.
- Non sovrapporre più di due contenitori.
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare materiali assorbenti idonei.



ATTENZIONE

Provoca grave irritazione oculare.

Lavare accuratamente gli occhi dopo l'uso.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente secondo le normative vigenti.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

N° UFI: 3P00-Y0YW-900P-XWCP